


Hydrocodone

Printed from <https://www.cancerquest.org/es/para-los-pacientes/referencia-de-drogas/hydrocodone> on 05/21/2026



Brand name: Lortab®

Brand name: Maxidone®

Brand name: Norco®

Brand name: Vicodin®

Brand name: Vicoprofen®

Brand name: Zydone®

IUPAC: 4,5a-Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one

FDA approval: Yes

[Manufacturer Link](#)

Usage: La hidrocodona también puede ser dada en forma de una gragea o un líquido, usualmente varias veces al día. La hidrocodona es disponible en varias formas con conjunto con otros medicamentos: Lortab® (con acetaminofén) Maxidone® (con acetaminofén) Norco® (con acetaminofén) Vicodina® (con acetaminofén) Vicoprofeno® (con ibuprofeno) Zydone® (con acetaminofén)

Mechanism: La hidrocodona es un narcótico semisintético que tiene propiedades similares a los de la codeína. Ésta se une primordialmente al receptor opioide mu para aliviar el dolor.

Side effects: Mareos y vértigos Somnolencia Náusea y vómito La hidrocodona puede ser adictiva. Los síntomas de aislamiento psicológicos y fisiológicos pueden ocurrir si el paciente se vuelve dependiente. Con el uso prolongado, la tolerancia puede volverse un problema, requiriendo de dosis más altas para aliviar el dolor. El alcohol puede intensificar algunos de los efectos secundarios mentales y emocionales de la hidrocodona, tales como la somnolencia y los cambios del humor. Los pacientes deben de evitar el consumo alcohólico mientras estén tomando hidrocodona. La hidrocodona puede causar depresión respiratoria en dosis más altas. Esto puede resultar en un retardo potencialmente peligroso del ritmo respiratorio del paciente.