

# Meperidine

Printed from <https://www.cancerquest.org/es/para-los-pacientes/referencia-de-drogas/meperidine> on 04/22/2024



Brand name: Demerol®

IUPAC: ethyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate

FDA approval: Yes

[Manufacturer Link](#)

Usage: La meperidina es un narcótico con acciones similares a la morfina. Ésta se une primordialmente al receptor opioide mu para aliviar el dolor. La meperidina es dada en forma de una gragea, líquido o inyección, usualmente varias veces al día. La marca de la meperidina es Demerol®.

Mechanism: La meperidina es un narcótico con acciones similares a la morfina. Ésta se une primordialmente al receptor opioide mu para aliviar el dolor.

Side effects: Efectos Adversos: -Mareos y vértigos -Sedación o somnolencia -Náusea y vómito -Sudor La meperidina puede ser adictiva. Los síntomas de aislamiento psicológicos y fisiológicos pueden ocurrir si el paciente se ha vuelto dependiente. Con el uso prolongado, la tolerancia también puede ser un problema, requiriendo de dosis más altas para alcanzar el alivio del dolor. El alcohol puede intensificar algunos de los efectos secundarios emocionales y mentales de la meperidina, tales como la somnolencia y los cambios del humor. Los pacientes deben de evitar el consumo de las bebidas alcohólicas mientras estén tomando meperidina. La meperidina puede causar depresión respiratoria. Esto puede resultar en un retardo potencialmente peligroso del ritmo respiratorio del paciente.