


Morphine

Printed from <https://www.cancerquest.org/es/para-los-pacientes/referencia-de-drogas/morphine> on 06/06/2026



Brand name: MS Contin®

FDA approval: Yes

[Manufacturer Link](#)

Usage: La morfina puede ser administrada en forma de una gragea, líquido, supositorio o inyección. La dosis depende de la forma de la morfina administrada. La morfina es disponible en varias formas: * Inyección Atramorph® * Cápsulas de liberación prolongada Avinza® * Inyección Duramorph® * Solución Infumorph® * Cápsulas de liberación sostenida Kadian® * Grageas de liberación controlada MS CONTIN® * Grageas de liberación inmediata, cápsulas o solución MSIR® * Grageas de liberación sostenida Oramorph® * Soluciones orales y supositorios Roxanol®

Mechanism: La morfina es un narcótico que se une primordialmente al receptor opioide mu para aliviar el dolor.

Side effects: Efectos Adversos * Mareos y vértigos * Sedación o somnolencia * Náusea y vómito * Sudor * Cambios del humor * Estreñimiento Uno de los peligros mayores de la terapia con la morfina es la depresión respiratoria. Esto puede resultar en un retardo potencialmente peligroso del ritmo respiratorio del paciente. La morfina puede ser adictiva. Los síntomas de aislamiento psicológicos y fisiológicos pueden ocurrir si el paciente se ha vuelto dependiente. Con el uso prolongado, la tolerancia también puede ser un problema, requiriendo de dosis más altas para aliviar el dolor. El alcohol puede intensificar algunos de los efectos secundarios mentales y emocionales de la morfina, tales como la somnolencia y los cambios del humor. Los pacientes deben de evitar el consumo de las bebidas alcohólicas mientras estén tomando morfina.