


Oxaliplatin

Printed from <https://www.cancerquest.org/es/para-los-pacientes/referencia-de-drogas/oxaliplatin> on 05/29/2026



Brand name: Eloxatin®

IUPAC: (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine; oxalate; platinum(+2) cation

FDA approval: Yes

[Manufacturer Link](#)

Usage: El oxaliplatino es usado primordialmente para tratar cáncer colorectal metastático o recurrente. El oxaliplatino es administrado como una infusión intravenosa.

Mechanism: El oxaliplatino (Eloxatin®) es un agente alquilante que previene la replicación y la transcripción del ADN al causar puentes cruzados entre las bases de ADN.

Side effects: Efectos secundarios comunes incluyen Neuropatía, cansancio y debilidad, diarrea, náusea y vómito, dolor abdominal, fiebre, pérdida del apetito, dolor. Los efectos secundarios pueden ser diferentes o más intensos si el oxaliplatino es tomado con otros medicamentos. Varios pacientes sufren de neuropatía lo cual aparece más comúnmente como espasmos, cosquilleo, o sensaciones anormales de la lengua que pueden empeorar en temperaturas bajas. La neuropatía puede ser temporal o puede persistir después de que el tratamiento haya terminado. El oxaliplatino no debe ser tomado por las mujeres que se encuentran o piensan volverse embarazadas ya que éste puede tener efectos tóxicos sobre el feto. Este medicamento podría tener efectos negativos sobre la fertilidad en los años después del tratamiento. Los conteos bajos de células sanguíneas puede resultar del tratamiento de oxaliplatino lo cual hace necesario que exámenes de sangre sean realizadas antes de cada infusión. Los pacientes también deben de indicarle a sus doctores si algunas señales de infección aparecen, tales como la fiebre, diarrea persistente, o tos.