

Un fármaco de cesación tabáquica podría asociarse con un riesgo elevado de complicaciones cardiovasculares

Printed from <https://www.cancerquest.org/es/sala-de-prensa/2020/10/un-farmaco-de-cesacion-tabaquica-podria-asociarse-con-un-riesgo-elevado-de> on 05/20/2026



El uso de la Vareniclina (nombre comercial - Champix®, fabricado por Pfizer), un fármaco común para la cesación tabáquica, podría estar relacionado con un riesgo elevado de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Un meta-análisis, una revisión de una gran cantidad de estudios de un área en particular, halló que los la mayoría de los fumadores que reportaron haber tomado este medicamento con frecuencia, reportaron haber sufrido de problemas severos del corazón, incluyendo la arritmia y la insuficiencia cardíaca.

Las implicaciones que surgen de este estudio han sido desafiadas por otros investigadores que afirman que los riesgos son leves y que los beneficios de la cesación son mucho mayores a los riesgos que trae el fármaco. Los fumadores que están considerando el uso de este medicamento deberían conversar con su médico acerca de sus riesgos.

Fuente

<http://www.cmaj.ca/content/early/2011/07/04/cmaj.110218>

Referencia

[Aprenda más](#)