

¿Las mujeres deprimidas tienen menos probabilidades de recibir una atención adecuada contra el cáncer de mama?

Printed from <https://www.cancerquest.org/es/sala-de-prensa/2020/09/las-mujeres-deprimidas-tienen-menos-probabilidades-de-recibir-una-atencion> on 06/23/2026



Un estudio de 45,000 mujeres danesas que habían sido diagnosticadas con cáncer de mama entre 1998 y 2011 mostró que las mujeres que habían tomado antidepresivos tenían menos probabilidades de recibir los tratamientos recomendados contra el cáncer a diferencia de las mujeres que nunca habían tomado antidepresivos.

Además, las mujeres que habían tomado antidepresivos tenían una tasa de supervivencia general más baja para el cáncer de mama. El 13 por ciento de las pacientes que habían tomado antidepresivos murieron de cáncer de mama dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico, en comparación con el 11 por ciento de las pacientes que nunca habían tomado antidepresivos.

¿Cuál es el vínculo? Una posibilidad es que las mujeres que han experimentado depresión pueden tener un mayor riesgo de recibir un tratamiento de cáncer de mama no estándar. Si bien esta es solo una posible explicación, el estudio es importante porque muestra lo importante que es que los médicos presten atención a la salud psicológica (y la historia) de sus pacientes. Las mujeres que tienen antecedentes de depresión pueden necesitar apoyo adicional al tomar decisiones sobre su propia salud y opciones de tratamiento.

Fuente

[Original Study](#)

Referencia

[CancerQuest sobre la depresión y el cáncer](#)