


Bosutinib

Printed from <https://www.cancerquest.org/es/node/6425> on 07/03/2026



Brand name: Bosulif®

IUPAC: 4-(2,4-dichloro-5-methoxyanilino)-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline-3-carbonitrile

FDA approval: Yes

[Enlace del fabricante](#)

Usage:

Usualmente, el Bosulif se toma una vez por día. Siga todas las indicaciones de su receta médica. Su médico podría alterar su dosis para garantizar los mejores resultados. No tome la medicina en cantidades menores o mayores de lo que se recomienda.

Tome el medicamento con comida. No quiebre o triture la tableta del Bosulif, pues puede ser peligroso si el residuo de la tableta entra en contacto con su piel. Si esto ocurre, lave su piel con agua y jabón. Consulte a su doctor o farmacéutico cómo manejar y/o desechar una tableta rota de Bosulif. Es probable que usted necesite realizarse exámenes médicos con frecuencia para asegurarse que el Bosulif no esté causando efectos dañinos, cuyos resultados podrían retrasar su tratamiento para el cáncer. No detenga el uso de Bosulif sin consultar previamente a su médico. Mantenga al fármaco guardado a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor.

Mechanism:

El BOSULIF es un medicamento que se receta para tratar a aquellos adultos que sufren de la leucemia Ph+ LMC, que no lograron tolerar o gozar de los beneficios de tratamientos previos. Tome en cuenta que el BOSULIF no funciona de la misma manera en todos los pacientes. Aun no se puede garantizar la seguridad en el uso del BOSULIF en tratamientos para pacientes menores de 18 años de edad. El BOSULIF pertenece a un grupo de fármacos denominado inhibidores de tirosina-quinasa (abreviación del singular: ITK). Es probable que el paciente ya haya tomado medicamentos similares. Los médicos pueden cambiar la receta médica si los medicamentos dejan de funcionar o si los efectos adversos correspondientes se vuelven inmanejables.

Side effects:

Los efectos secundarios comunes del Bosulif incluyen: dolor de cabeza, mareos, sensación de cansancio, incomodidad leve en el estómago, dolor en las articulaciones, dolor de espalda, picazón leve o sarpullidos, o síntomas de un resfriado (por ejemplo, el catarro, estornudos frecuentes y dolor de garganta).

Procure conseguir ayuda médica inmediata si usted manifiesta cualquiera de estos síntomas de una reacción alérgica al Bosulif: ronchas, dificultad al respirar, hinchazón del rostro/labios/lengua o garganta. Detenga el uso del Bosulif y llame a su médico si experimenta: deposiciones negras/sangrientas/alquitranadas, tos sangrienta, vómito que luce como café molido, fiebre, escalofríos, dolor corporal, síntomas de la gripe, lesiones en la boca o garganta, piel pálida, hematomas frecuentes, sangrados inusuales (en la nariz, boca, vagina, o en el recto), puntos rojos o morados debajo de la piel, dolor estomacal superior, picazón, pérdida del apetito, orina oscurecida, deposiciones del color de la arcilla, ictericia (coloración amarillenta en los ojos o en la piel), hinchazón en las manos o pies, incremento rápido de peso, dolor en el pecho, dolor en el lado izquierdo o detrás del esternón, dolor al respirar, arritmias, falta de aliento (especialmente si está acostado), ansiedad, sudor, jadeos, tos con moco espumoso, debilidad, cansancio o mareos.