


# Ado-trastuzumab emantasina

Printed from <https://www.cancerquest.org/es/node/6430> on 06/26/2026



Brand name: Kadcyła®

FDA approval: Yes

[Enlace del fabricante](#)

Usage:

El Kadcyła™ se administra a través de una infusión a la vena (vía intravenosa).

La cantidad de Kadcyła™ que un paciente recibe depende de varios aspectos, incluyendo el peso, el estado general de salud u otros problemas de salud, y el tipo de cáncer o de enfermedad a tratar. Su doctor determinará la dosis y el itinerario.

Mechanism:

Kadcyła®

Side effects:

Efectos secundarios del Kadcyła™:

Aspectos importantes de los efectos secundarios del Kadcyła™ para recordar:

- La mayoría de las personas no experimentarán todos los efectos secundarios del Kadcyła™ en este listado
- Los efectos secundarios del Kadcyła™ se pueden predecir con frecuencia cuando se trata de sus inicios, la duración y la severidad.
- Los efectos secundarios del Kadcyła™ mejorarán después que se complete la terapia.
- Los efectos secundarios del Kadcyła™ se pueden manejar con facilidad. Existen varias opciones para minimizar o prevenir los efectos adversos.

Los efectos secundarios comunes (ocurren en más del 30% de casos) que experimentan los pacientes que toman Kadcyła™ son los siguientes: niveles incrementados de enzimas del hígado (AST y ALT), conteo reducido de plaquetas, cantidad reducida de glóbulos rojos y de leucocitos, náuseas, fatiga, dolor musculoesquelético (dolor en los músculos y en las articulaciones), y niveles reducidos de potasio.

Los siguientes efectos secundarios que experimentan los pacientes que reciben Kadcyła™ son menos comunes (ocurren en el 10%-29% de los casos): dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, sangrado de la nariz, neuropatía periférica (amortiguación en las manos o en los pies), vómito, fiebre, dolor abdominal, tos, debilidad, niveles incrementados de bilirrubina, sequedad en la boca, lesiones en la boca, insomnio (dificultad para dormir), falta de aliento, sarpullidos y mareos.